Sipfol® Max

Aminoácidos

Siempre saldrás ganando

Capacidad 1 l | 5 l | 20 l | 750 l

Composición	Aminoácidos libres 12,0% p/ Nitrógeno (N) total 8,5% p/p Nitrógeno (N) orgánico 6,7% p/p Nitrógeno (N) ureico 1,2% p/p Nitrógeno (N) amoniacal 0,6% p/p
Formulación	(SL) - Concentrado soluble

CARACTERÍSTICAS

Por su contenido en aminoácidos y nitrógeno orgánico (materia orgánica total 28% p/p), proporciona a las plantas un medio nutritivo y estimulante de acción inmediata, independientemente de su función clorofílica, ya que pasa rápidamente a la savia elaborada y es utilizado directamente por los vegetales para su desarrollo.

Estimula la inducción floral, favorece el cuajado, incrementa los calibres, mejora la consistencia de la piel y anticipa la maduración de los frutos.

Por su pH, posee un efecto penetrante y tamponizador, así como mejorante de los caldos o aguas de pulverización, y por su poder adherente, no necesita ser aplicado con mojante.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Aplicar vía foliar en pulverización normal y a bajo volumen, aplicar de 1 a 3 l/ha. Aplicar vía radicular de 2 a 4 l/ha. En platanera, aplicar vía radicular a 1,5-2 cc/planta y semana. El número de aplicaciones a lo largo de todo el ciclo vegetativo es de 2 a 4 dependiendo del cultivo. Aconsejamos consultar con alguno de nuestros técnicos para un óptimo uso del producto. No mezclarlo con aceites insecticidas y sales de cobre sin haber comprobado el efecto fitotóxico de la mezcla sobre el cultivo y estado concreto, ni sobrepasar las dosis, en invernaderos y en mezclas con azufre, de 300 cc por cada 100 litros de agua en cultivos sensibles. No emplear en ciruelos ni en cultivos ornamentales para flor cortada en los que no se hayan hecho pruebas previamente.

ÉPOCA DE EMPLEO

Debe ser empleado en los primeros estados de desarrollo de las plantas para estimular su crecimiento rápidamente (viveros, plantaciones jóvenes, semilleros, momentos de transplantes, etc.), en los mmomentos precedentes y posteriores a la floración, cuajado y engorde de los frutos, en el caso de recuperación de cultivos enfermos, circustancias adversas (frío, granizo, sequía, fitotoxicidades, etc.), así como en cualquier momento del cultivo, en especial en el momento de la última fase vegetativa de los frutos.

CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres 12,0% p/p

Nitrógeno (N) total 8,5% p/p

Nitrógeno (N) orgánico 6,7% p/p

Nitrógeno (N) uréico 1,2% p/p

Nitrógeno (N) amoniacal 0,6% p/p

Aminograma: Alanina, Arginina, Ácido aspártico, Ácido glutámico, Glicina (35% p/p), Hidroxiprolina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Triptófano, Valina.

pH:5,8

SIPCAM IBERIA

Aminoácidos obtenidos por hidrólisis de proteínca de origen animal.

Clase A - “Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación”.

Cultivos	Días	Beneficios	Dosis
Arroz	n.p.	Estimula la inducción floral, favorece el cuajado, incrementa los calibres, mejora la consistencia de la piel, anticipa la maduración de los frutos.	150-300 cc/hl
Cereales			
Cítricos			
Frutales de hoja caduca			
Hortícolas (aire libre e invernadero)			
Industriales			
Legumbres forrajeras			
Leguminosas de grano			
Olivo			
Ornamentales leñosas			
Otros cultivos			
Vid			
Viveros y plantaciones jóvenes			

SIPCAM
IBERIA