



Fungicida – bactericida

Composición	Hidróxido cúprico (exp. en Cu) _ 20 % p/p (200 g/kg)
Formulación	(WG) Microgranulado Soluble
Nº Registro	25 277

CARACTERÍSTICAS

Fungicida/bactericida de contacto.

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicación del producto mediante pulverización normal con tractor (solo aire libre) o mediante pulverización manual con lanza/pistola o mochila (aire libre e invernadero).

Bulbos hortícolas (Ajo, cebolla y chalote) - aire libre. Aplicar el producto desde que la 4ª hoja es claramente visible hasta que el 10% de las plantas tienen las hojas inclinadas (BBCH 14-47).

Col. Aplicar el producto desde que la cabeza comienza a formarse hasta que los primeros pétalos florales sean visibles (BBCH 10-59)

Alcachofa. Aplicar el producto desde la 4ª hoja es claramente visible hasta que los órganos florales o botones florales estén visibles (BBCH 14-51)

Puerro. Aplicar el producto desde la 4ª hoja es claramente visible hasta que el bulbo comienza a alargarse (BBCH 14-51)

Avellano, castaño y pistacho (Antracnosis (Massonina juglansis y Labrella coryli); Mancha foliar (Mycosphaerella malculiformis) ; Mal del desgarro (Cytospora corylicola)). Aplicar en post-floración, entre la post-cosecha y la formación de las yemas (BBCH 91-97)

Tomate y berenjena - aire libre e invernadero. Aplicar el producto desde la 5ª hoja verdadera principal desplegada hasta madurez completa (BBCH 15-89).

Brécol. Aplicar el producto desde cotiledones completamente desplegados hasta madurez completa (BBCH 10-59).

Cucurbitáceas de piel comestibles (pepino, calabacín y pepinillos) - aire libre e invernadero. Aplicar el producto desde que los cotiledones están completamente desplegados hasta madurez completa (BBCH 10-89).

Cucurbitáceas de piel no comestibles (melón y sandía) - aire libre. Aplicar el producto desde que los cotiledones están completamente desplegados hasta madurez completa (BBCH 10-89).

Fresal - aire libre e invernadero. Aplicar el producto desde que hay 3 hojas desplegadas hasta que la segunda cosecha (BBCH 13-85).

Frutales de hueso y frutales de pepita. Aplicar desde post-cosecha (BBCH 91-97) hasta pre-floración (BBCH 51-79).

Lechuga y similares (Incluye hierba de los canónigos, escarola, mastuerzo, barbareas, rúcula, roqueta, mostaza china y hojas y brotes de Brassica) - aire libre e invernadero. Aplicar el producto desde 2ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza la altura típica (BBCH 12-49).

Olivo. Aplicar el producto entre primavera y otoño, desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta que aumente la coloración específica de los frutos (BBCH 10-85).

Patata. Aplicar el producto desde la 5ª hoja del tallo principal desplegada hasta bayas de fructificación de primer grado de color ocre o amarronadas (BBCH 15-89).

Cultivo	Plaga/ Efecto	Dosis (‰)	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo (l/ha)	Plazo de seguridad (días)		
Frutales de hueso	Monilia, cribado, bacteriosis y abolladura	0,375 (Dosis máx: 7,5 kg/ha y año)	1 - 2	14 - 21	1000	NP		
Frutales de pepita	Moteado, monilia y bacteriosis			7 - 21				
Olivo	Repilo y bacteriosis	0,375 (Dosis máx: 10,5 kg/ha y año)		21		14		
Patata	Mildiu	0,25	1 - 4	7 - 14		1000	Aire libre: 10 Invernadero: 3	
Bulbos hortícolas	Alternaria, Antracnosis y bacteriosis	0,375						
Coles	Mildiu	0,25						
Tomate, Berenjena y Pimiento	Bacteriosis, alternaria y mildiu	0,375						
Cucurbitáceas de piel comestible	Bacteriosis y mildiu	0,25						
Cucurbitáceas de piel no comestible								
Puerro								
Brécol								
Alcachofa	Bacteriosis	0,375						1 - 3
	Mildiu							
Fresal	Bacteriosis y viruela	0,375	1 - 4	Aire libre: 3 Invernadero: 7				
Lechugas y similares	Bacteriosis y alternaria							
Avellano, Castaño y Pistacho	Antracnosis, mancha foliar y mal de desgarro	0,26 - 0,28	1 - 3	14 - 21		NP		